

TABELA 2. Wskazówki dla nadzoru medycznego u dzieci z zespołem Turnera.

	Okres prenatalny	Okres niemowlęcy, 1 m-c do 1 roku życia					Wczesne dzieciństwo, 1 do 5 lat					Późne dzieciństwo 5 do 13 lat, corocznie	Okres młodzieńczy 13 do 21 lat corocznie
		Noworodek	2 m-ce	4 m-ce	6 m-cy	9 m-cy	12 m-y	24 m-ce	3 lata	4 lata	5 lat		
w czasie diagnozy													
Skierowanie do genetyka													
Skierowanie do endokrynologa													
Skierowanie do kardiologa													
Poradnictwo zapobiegawcze													
Sprawdzić wsparcie rodzinne	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP
Grupy wsparcia w przypadku stresu	TBP	TBP	TBP				TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP
Planowanie długoterminowe	TBP	TBP	TBP				TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP
Badania medyczne													
Mały przyrost wzrostu	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP
Dysplazja bioder		TBP	TBP	TBP	TBP	TBP							
Obrzęk limfatyczny TBP		TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP			TBP
Nadciśnienie/ koarktacja			TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP		TBP
Utrata słuchu		O	S	S	O	S	O	S	O+	S	S	S+	S+
Zez		S	S	O	O	O	O	O+	O	O	O	S	S
Nieprawidłowy zgryz								TBP	TBP	TBP	TBP	TBP+	TBP+
Zaburzenie czynności tarczycy										TBP		TBP	TBP
Skolioza lub kifoza										O	O	O	O
Opóźniony okres dojrzewania												TBP	TBP
Znamiona												TBP	TBP
Ocena psycho-społeczna													
Rozwój i zachowanie		TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP+	TBP
Szkoła									TBP+	TBP	TBP	TBP+	TBP
Uspołecznienie		TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP	TBP+	TBP	TBP+	TBP
Seksualność												TBP	TBP

TBP oznacza 'ma być przeprowadzone'; S, subiektywnie zgodnie z historią; O, obiektywnie wg standardowych metod badań.

*Sprawdzić zgodność z Praktyką i Medycyną Ambulatoryjną Komisji Pediatrii Amerykańskiej Akademii. Zalecenia zapobiegawczej opieki pediatrycznej. *Pediatrics*. 2000; 105:645. +Jedne rutynowe badanie przeprowadzone przez specjalistę w czasie tych okresów bez względu na historię i wyniki badań: badania audiologiczne, ortodontyczne i psycho-edukacyjne.